

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Bělá		km 0,000 - 24,000		3. vegetační stupeň	
<b>vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</b>					
břehové porosty		zastoupení v %		doprovodné porosty	
		zastoupení v %			
<b>stromy základní</b>					
Salix fragilis (vrba křehká)		70-100		Salix fragilis (vrba křehká)	
Salix x rubens (vrba červenavá)		0-30		Salix x rubens (vrba červenavá)	
<b>stromy doplňkové</b>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		0-10		Alnus glutinosa (olše lepkavá)	
				Padus avium (střemcha hroznovitá)	
				Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	
<b>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</b>					
Salix viminalis (vrba košíkářská)				Salix viminalis (vrba košíkářská)	
Salix purpurea (vrba nachová)				Salix purpurea (vrba nachová)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Bělá		km 0,000 - 24,000		3. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<b><i>stromy základní</i></b>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)	40-80	Alnus glutinosa (olše lepkavá)	30-50		
Salix fragilis (vrba křehká)	30-60	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	30-40		
Salix x rubens (vrba červenavá)	0-30	Salix fragilis (vrba křehká)	10-30		
		Salix x rubens (vrba červenavá)	10-20		
<b><i>stromy doplňkové</i></b>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	0-10	Populus nigra (topol černý)	10-20		
Padus avium (střemcha hroznovitá)	0-10	Padus avium (střemcha hroznovitá)	0-10		
		Acer platanooides (javor mléč)	0-10		
		Acer pseudoplatanus (javor klen)	0-10		
		Tilia cordata (lípa srdčitá)	0-10		
		Ulmus laevis (jilm vaz)	0-10		
<b><i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i></b>					
Salix viminalis (vrba košíkářská)		Viburnum opulus (kalina obecná)			
Salix purpurea (vrba nachová)		Sambucus nigra (bez černý)			
		Euonymus europaeus (brslen evropský)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Bělá		km 0,000 - 24,000		3. vegetační stupeň	
<b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<b>stromy základní</b>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)	30-60	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	40-80		
Salix fragilis (vrba křehká)	20-50	Tilia cordata (lípa srdčitá)	20-50		
Salix x rubens (vrba červenavá)	10-20	Acer platanoides (javor mléč)	20-40		
<b>stromy doplňkové</b>					
Padus avium (střemcha hroznovitá)	0-10	Alnus glutinosa (olše lepkavá)	0-10		
Tilia cordata (lípa srdčitá)	0-10	Quercus robur (dub letní)	0-10		
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	0-10	Padus avium (střemcha hroznovitá)	0-10		
		Acer pseudoplatanus (javor klen)	0-10		
		Ulmus laevis (jilm vaz)	0-10		
		Alnus incana (olše šedá)	0-10		
<b>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</b>					
Salix viminalis (vrba košíkářská)		Corylus avellana (líška obecná)			
Salix purpurea (vrba nachová)		Swida sanguinea (svída krvavá)			
		Salix caprea (vrba jíva)			
		Sambucus nigra (bez černý)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.