

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Bělá		km 24,000 - 31,100		4. vegetační stupeň	
<b><i>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		30-70		Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	
Salix fragilis (vrba křehká)		30-50		Tilia cordata (lípa srdčitá)	
				Acer pseudoplatanus (javor klen)	
				Alnus glutinosa (olše lepkavá)	
<i>stromy doplňkové</i>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		10-40		Alnus incana (olše šedá)	
Alnus incana (olše šedá)		0-10		Salix fragilis (vrba křehká)	
				Ulmus laevis (jilm vaz)	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix purpurea (vrba nachová)				Salix caprea (vrba jíva)	
Salix cinerea (vrba popelavá)				Corylus avellana (líška obecná)	
				Sambucus nigra (bez černý)	
				Euonymus europaeus (brslen evropský)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků

(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Bělá		km 24,000 - 31,100		4. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<b><i>stromy základní</i></b>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		40-80		Alnus glutinosa (olše lepkavá)	
Salix fragilis (vrba křehká)		20-30		Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	
				Salix fragilis (vrba křehká)	
				10-30	
<b><i>stromy doplňkové</i></b>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		10-20		Alnus incana (olše šedá)	
Alnus incana (olše šedá)		0-20		Acer pseudoplatanus (javor klen)	
				Tilia cordata (lípa srdčitá)	
				0-10	
				0-10	
<b><i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i></b>					
Salix purpurea (vrba nachová)		Sambucus racemosa (bez hroznatý)			
Salix cinerea (vrba popelavá)		Salix cinerea (vrba popelavá)			
		Euonymus europaeus (brslen evropský)			
		Salix caprea (vrba jíva)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.