

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Bělá		km 31,100 - 32,400		5. vegetační stupeň	
<i>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		30-70		Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	
Salix fragilis (vrba křehká)		30-50		Alnus incana (olše šedá)	
				Acer pseudoplatanus (javor klen)	
				Alnus glutinosa (olše lepkavá)	
				Tilia cordata (lípa srdčitá)	
<i>stromy doplňkové</i>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		10-40		Salix fragilis (vrba křehká)	
Alnus incana (olše šedá)		0-10		Ulmus laevis (jilm vaz)	
				Ulmus montana (jilm horský)	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix purpurea (vrba nachová)				Salix caprea (vrba jíva)	
Salix cinerea (vrba popelavá)				Corylus avellana (líška obecná)	
				Sambucus nigra (bez černý)	
				Euonymus europaeus (brslen evropský)	
				Lonicera nigra	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Bělá		km 31,100 - 32,400		5. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)	40-80	Alnus glutinosa (olše lepkavá)	40-60		
Salix fragilis (vrba křehká)	20-40	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	30-60		
		Salix fragilis (vrba křehká)	10-30		
		Alnus incana (olše šedá)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	10-20	Acer pseudoplatanus (javor klen)	0-10		
Alnus incana (olše šedá)	0-20	Tilia cordata (lípa srdčitá)	0-10		
		Ulmus laevis (jilm vaz)	0-10		
<i>příпустné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix purpurea (vrba nachová)		Sambucus racemosa (bez hroznatý)			
Salix cinerea (vrba popelavá)		Salix cinerea (vrba popelavá)			
		Euonymus europaeus (brslen evropský)			
		Salix caprea (vrba jíva)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.