

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Bílá Opava		km 0,000 - 7,800		5.vegetační stupeň	
<i>vrbiný vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	50-100	vrba křehká (Salix fragilis)	40-80	olše šedá (Alnus incana)	10-30
		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
olše šedá (Alnus incana)	20-30	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-20	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10				
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Bílá Opava		km 0,000 - 7,800		5.vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	40-60	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-80		
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	olše šedá (Alnus incana)	0-30		
olše šedá (Alnus incana)	0-30	vrba křehká (Salix fragilis)	10-30		
		jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		smrk ztepilý (Picea abies)	0-10		
		topol osika (Populus tremula)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			
		vrba popelavá (Salix cinerea)			
		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		krušina olšová (Frangula alnus)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
		vrba jíva (Salix caprea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Bílá Opava		km 0,000 - 7,800		5.vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris					
břehové porosty		zastoupení v %		doprovodné porosty	
		zastoupení v %			
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50		
olše šedá (Alnus incana)	0-30	javor klen (Acer pseudoplatanus)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	40-60	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	olše šedá (Alnus incana)	0-20		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	jilm horský (Ulmus glabra)	0-20		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	vrba křehká (Salix fragilis)	0-10		
		topol osika (Populus tremula)	0-20		
		buk lesní (Fagus sylvatica)	0-10		
		smrk ztepilý (Picea abies)	0-10		
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
		jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		krušina olšová (Frangula alnus)			
		vrba jíva (Salix caprea)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
		zimolez černý (Lonicera nigra)			
		vrba popelavá (Salix cinerea)			
		vrba ušatá (Salix aurita)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.