

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů porostů - geobiocénů)

| Vodní tok: Budišovka | | km 0,000 - 19,270 | | 4. vegetační stupeň | |
|---|--|-------------------|--|-----------------------------------|--|
| <i>vrby vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</i> | | | | | |
| <i>břehové porosty</i> | | zastoupení v % | | <i>doprovodné porosty</i> | |
| <i>stromy základní</i> | | | | | |
| vrba křehká (Salix fragilis) | | 80-100 | | vrba křehká (Salix fragilis) | |
| <i>stromy doplňkové</i> | | | | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | | 0-20 | | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | |
| olše šedá (Alnus incana) | | 0-10 | | střemcha hroznovitá (Padus avium) | |
| střemcha hroznovitá (Padus avium) | | 0-10 | | olše šedá (Alnus incana) | |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i> | | | | | |
| vrba nachová (Salix purpurea) | | | | vrba nachová (Salix purpurea) | |
| vrba trojmužná (Salix triandra) | | | | vrba trojmužná (Salix triandra) | |
| vrba košíkářská (Salix viminalis) | | | | vrba košíkářská (Salix viminalis) | |

Poznámka: Poměrné zastoupení dřevin v % se na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřev

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů porostů - geobiocénů)

| Vodní tok: Budišovka | | km 0,000 - 19,270 | | 4. vegetační stupeň | |
|---|-------|------------------------------------|-------|---------------------------|--|
| <i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i> | | | | | |
| <i>břehové porosty</i> | | zastoupení v % | | <i>doprovodné porosty</i> | |
| <i>stromy základní</i> | | | | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 40-60 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 50-80 | | |
| v rba křehká (Salix fragilis) | 40-60 | v rba křehká (Salix fragilis) | 10-30 | | |
| v rba červenavá (Salix x rubens) | 0-30 | v rba červenavá (Salix x rubens) | 0-30 | | |
| | | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 20-40 | | |
| <i>stromy doplňkové</i> | | | | | |
| olše šedá (Alnus incana) | 0-10 | olše šedá (Alnus incana) | 0-10 | | |
| střemcha hroznovitá (Padus avium) | 10-20 | střemcha hroznovitá (Padus avium) | 10-20 | | |
| jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 10-20 | smrk ztepilý (Picea abies) | 0-20 | | |
| | | javor klen (Acer pseudoplatanus) | 0-10 | | |
| | | topol osika (Populus tremula) | 0-10 | | |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i> | | | | | |
| v rba nachová (Salix purpurea) | | v rba nachová (Salix purpurea) | | | |
| v rba košíkářská (Salix viminalis) | | v rba košíkářská (Salix viminalis) | | | |
| v rba ušatá (Salix aurita) | | v rba ušatá (Salix aurita) | | | |
| | | kalina obecná (Viburnum opulus) | | | |
| | | krušina olšová (Frangula alnus) | | | |
| | | bez černý (Sambucus nigra) | | | |
| | | bez hroznatý (Sambucus racemosa) | | | |

Poznámka: Poměrné zastoupení dřevin v % se na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřev

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů porostů - geobiocénů)

| Vodní tok: Budišovka | | km 0,000 - 19,270 | | 4. vegetační stupeň | |
|--|-------|------------------------------------|-------|---------------------------|--|
| javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris | | | | | |
| <i>břehové porosty</i> | | zastoupení v % | | <i>doprovodné porosty</i> | |
| <i>stromy základní</i> | | | | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 40-60 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 10-30 | | |
| vrbka křehká (Salix fragilis) | 30-40 | javor klen (Acer pseudoplatanus) | 20-40 | | |
| vrbka červenavá (Salix x rubens) | 0-30 | lípa srdčitá (Tilia cordata) | 20-40 | | |
| | | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 20-40 | | |
| <i>stromy doplňkové</i> | | | | | |
| jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 10-20 | olše šedá (Alnus incana) | 0-10 | | |
| olše šedá (Alnus incana) | 0-10 | smrk ztepilý (Picea abies) | 0-10 | | |
| javor klen (Acer pseudoplatanus) | 0-10 | vrbka křehká (Salix fragilis) | 0-10 | | |
| střemcha hroznovitá (Padus avium) | 10-20 | javor mléč (Acer platanoides) | 10-20 | | |
| | | topol osika (Populus tremula) | 0-10 | | |
| | | třešeň ptačí (Padus avium) | 0-10 | | |
| | | jilm horský (Ulmus glabra) | 0-10 | | |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i> | | | | | |
| vrbka nachová (Salix purpurea) | | krušina olšová (Frangula alnus) | | | |
| vrbka košíkářská (Salix viminalis) | | kalina obecná (Viburnum opulus) | | | |
| vrbka ušatá (Salix aurita) | | vrbka jíva (Salix caprea) | | | |
| | | bez černý (Sambucus nigra) | | | |
| | | bez hroznatý (Sambucus racemosa) | | | |
| | | líška obecná (Corylus avellana) | | | |

Poznámka: Poměrné zastoupení dřevin v % se na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřev