

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Černá voda		km 0,000 - 14,000		3 . vegetační stupeň	
vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
Salix fragilis (vrba křehká)	80-100	Salix fragilis (vrba křehká)	0-100		
<i>stromy doplňkové</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)	0-20	Alnus glutinosa (olše lepkavá)	0-20		
		Padus avium (střemcha hroznovitá)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix purpurea (vrba nachová)		Salix viminalis (vrba košíkářská)			
		Salix purpurea (vrba nachová)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků

(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Černá voda		km 0,000 - 14,000		3. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		40-70		Alnus glutinosa (olše lepkavá)	
Salix fragilis (vrba křehká)		30-50		Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	
				Salix fragilis (vrba křehká)	
				10-20	
<i>stromy doplňkové</i>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		0-20		Salix x rubens (vrba červenavá)	
Padus avium (střemcha hroznovitá)		0-10		Padus avium (střemcha hroznovitá)	
Salix x rubens (vrba červenavá)		0-10		Acer platanoides (javor mléč)	
				0-20	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix viminalis (vrba košíkářská)				Viburnum opulus (kalina obecná)	
Salix purpurea (vrba nachová)				Sambucus nigra (bez černý)	
				Salix caprea (vrba jíva)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Černý potok		km 0,000 - 14,000		3. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)		30-70		Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	
Salix fragilis (vrba křehká)		20-50		Tilia cordata (lípa srdčitá)	
				Acer platanoides (javor mléč)	
<i>stromy doplňkové</i>					
Padus avium (střemcha hroznovitá)		0-10		Alnus glutinosa (olše lepkavá)	
Tilia cordata (lípa srdčitá)		0-10		Quercus robur (dub letní)	
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)		0-20		Padus avium (střemcha hroznovitá)	
Acer pseudoplatanus (javor klen)		0-10		Acer pseudoplatanus (javor klen)	
Salix x rubens (vrba červenavá)		0-10		Carpinus betulus (habr obecný)	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix viminalis (vrba košíkářská)		Corylus avellana (líška obecná)			
Salix purpurea (vrba nachová)		Salix caprea (vrba jíva)			
		Viburnum opulus (kalina obecná)			
		Sambucus nigra (bez černý)			
		Euonymus europaeus (brslen evropský)			
		Sambucus racemosa (bez hroznatý)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.