

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Černý potok		km 14,000 - 14,800		4. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
Alnus glutinosa (olše lepkavá)	40-70	Alnus glutinosa (olše lepkavá)	40-60		
Salix fragilis (vrba křehká)	20-40	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	30-50		
		Salix fragilis (vrba křehká)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	0-20	Padus avium (střemcha hroznovitá)	0-20		
Padus avium (střemcha hroznovitá)	0-10	Acer pseudoplatanus (javor klen)	0-10		
		Populus tremula (topol osika)	0-10		
		Picea abies (smrk ztepilý)	0-20		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix purpurea (vrba nachová)		Viburnum opulus (kalina obecná)			
Salix viminalis (vrba košíkářská)		Salix purpurea (vrba nachová)			
		Sambucus racemosa (bez hroznatý)			
		Salix caprea (vrba jíva)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.