

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

| Vodní tok: Čížina   |  | km 15,500 - 23,495    |                                    | 4. vegetační stupeň |                       |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>         |  |                       |                                    |                     |                       |
| <i>břehové porosty</i>  |  | <i>zastoupení v %</i> | <i>doprovodné porosty</i>          |                     | <i>zastoupení v %</i> |
| <i>stromy základní</i>  |  |                       |                                    |                     |                       |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa)                                |  | 40-70                 | olše lepkavá (Alnus glutinosa)     |                     | 40-70                 |
| vrba křehká (Salix fragilis)                                  |  | 30-50                 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) |                     | 30-60                 |
| jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)                            |  | 20-40                 | vrba křehká (Salix fragilis)       |                     | 10-30                 |
|   |  |                       | olše šedá (Alnus incana)           |                     | 10-30                 |
| <i>stromy doplňkové</i>                                       |  |                       |                                    |                     |                       |
| sřemcha hroznovitá (Padus avium)                              |  | 10-30                 | sřemcha hroznovitá (Padus avium)   |                     | 10-20                 |
| olše šedá (Alnus incana)                                      |  | 10-30                 | javor klen (Acer pseudoplatanus)   |                     | 10-10                 |
|   |  |                       | topol osika (Populus tremula)      |                     | 0-10                  |
|   |  |                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)       |                     | 0-10                  |
|   |  |                       | smrk ztepilý (Picea abies)         |                     | 0-20                  |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i> |  |                       |                                    |                     |                       |
| vrba nachová (Salix purpurea)                                 |  |                       | kalina obecná (Viburnum opulus)    |                     |                       |
| vrba trojmužná (Salix triandra)                               |  |                       | krušina olšová (Frangula alnus)    |                     |                       |
| vrba košíkářská (Salix viminalis)                             |  |                       | bez černý (Sambucus nigra)         |                     |                       |
|   |  |                       | bez hroznatý (Sambucus racemosa)   |                     |                       |
|   |  |                       | vrba popelavá (Salix cinerea)      |                     |                       |
|   |  |                       | vrba nachová (Salix purpurea)      |                     |                       |

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

| Vodní tok: Čížina  |       | km 15,500 - 23,495                 |                    | 4. vegetační stupeň |                |
|--|-------|------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b> |       |                                    |                    |                     |                |
| břehové porosty  |       | zastoupení v %                     | doprovodné porosty |                     | zastoupení v % |
| <i>stromy základní</i>   |       |                                    |                    |                     |                |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa)                                 | 30-60 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 30-60              |                     |                |
| vrba křehká (Salix fragilis)                                   | 30-40 | lípa srdčitá (Tilia cordata)       | 20-40              |                     |                |
| jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)                             | 20-30 | javor klen (Acer pseudoplatanus)   | 20-40              |                     |                |
|  |       | olše lepkavá (Alnus glutinosa)     | 10-20              |                     |                |
|  |       | olše šedá (Alnus incana)           | 10-20              |                     |                |
| <i>stromy doplňkové</i>  |       |                                    |                    |                     |                |
| střemcha hroznovitá (Padus avium)                              | 0-20  | javor mléč (Acer platanooides)     | 10-20              |                     |                |
| javor klen (Acer pseudoplatanus)                               | 0-20  | vrba křehká (Salix fragilis)       | 0-10               |                     |                |
| olše šedá (Alnus incana)                                       | 0-20  | smrk ztepilý (Picea excelsa)       | 0-10               |                     |                |
|  |       | topol osika (Populus tremula)      | 0-10               |                     |                |
|  |       | střemcha hroznovitá (Padus avium)  | 0-10               |                     |                |
|  |       | buk lesní (Fagus sylvatica)        | 0-10               |                     |                |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>  |       |                                    |                    |                     |                |
| vrba nachová (Salix purpurea)                                  |       | kalina obecná (Viburnum opulus)    |                    |                     |                |
| vrba košíkářská (Salix viminalis)                              |       | krušina olšová (Frangula alnus)    |                    |                     |                |
| vrba popelavá (Salix cinerea)                                  |       | vrba jíva (Salix caprea)           |                    |                     |                |
|  |       | bez černý (Sambucus nigra)         |                    |                     |                |
|  |       | bez hroznatý (Sambucus racemosa)   |                    |                     |                |
|  |       | líška obecná (Corylus avellana)    |                    |                     |                |
|  |       | hloh obecný (Crataegus laevigata)  |                    |                     |                |

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.