

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Hrozová (Trója)	km 9,785 - 22,330	3. vegetační stupeň	
	olšové vrbiny = AIS = Alni glutinosae-saliceta		
	zastoupení v %	doprovodné porosty	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>			
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	50-70
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	vrba křehká (Salix fragilis)	0-30
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30
vrba bílá (Salix alba)	0-20	vrba bílá (Salix alba)	0-20
<i>stromy doplňkové</i>			
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba popelavá (Salix cinerea)	
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba trojmužná (Salix triandra)	
vrba trojmužná (Salix triandra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Hrozová (Trója)		km 9,785 - 22,330	3. vegetační stupeň	
dubové jaseniny = QFr = Querci roboris-fraxineta				
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>				
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	dub letní (Quercus robur)	40-60	
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50	
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20	
vrba bílá (Salix alba)	0-20			
<i>stromy doplňkové</i>				
dub letní (Quercus robur)	0-10	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-10	
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10	
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>				
vrba košíkářská (Salix viminalis)		brslen evropský (Euonymus europaea)		
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba popelavá (Salix cinerea)		
vrba trojmužná (Salix triandra)		svída krvavá (Swida sanguinea)		
		trnka obecná (Prunus spinosa)		
		bez černý (Sambucus nigra)		
		hloh obecný (Crataegus laevigata)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Hrozová (Trója)		km 9,785 - 22,330	3. vegetační stupeň	
topolo-jilmové jaseniny = UFrp = Ulmi-fraxineta populi				
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>				
vrba křehká (Salix fragilis)	0-50	dub letní (Quercus robur)	20-40	
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40	
vrba bílá (Salix alba)	0-20	topol černý (Populus nigra)	10-30	
<i>stromy doplňkové</i>				
topol černý (Populus nigra)	0-10	jilm polní (Ulmus minor)	0-10	
dub letní (Quercus robur)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10	
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	
		topol osika (Populus tremula)	0-10	
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>				
vrba košíkářská (Salix viminalis)		bez černý (Sambucus nigra)		
vrba trojmužná (Salix triandra)		brslen evropský (Euonymus europaea)		
vrba nachová (Salix purpurea)		hloh obecný (Crataegus laevigata)		
		svída krvavá (Swida sanguinea)		
		trnka obecná (Prunus spinosa)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Hrozová (Trója)		km 9,785-22,330	3. vegetační stupeň	
habro-jilmové jaseniny = UFrc = Ulmi-fraxineta carpini				
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>				
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	dub letní (Quercus robur)	20-40	
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50	
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	jilm polní (Ulmus minor)	10-20	
vrba bílá (Salix alba)	0-20	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30	
		habr obecný (Carpinus betulus)	10-20	
<i>stromy doplňkové</i>				
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	topol černý (Populus nigra)	0-10	
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	
		jilm horský (Ulmus glabra)	0-10	
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	
		třešeň ptačí (Cerasus avium)	0-10	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>				
vrba košíkářská (Salix viminalis)		svída krvavá (Swida sanguinea)		
vrba popelavá (Salix cinerea)		brslen evropský (Euonymus europaea)		
vrba trojmužná (Salix triandra)		bez černý (Sambucus nigra)		
		líška obecná (Corylus avellana)		
		řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus)		
		hloh obecný (Crataegus laevigata)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Hrozová (Trója)		km 9.785 - 22,330		3. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20		
		vrba červenavá (Salix x rubens)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba popelavá (Salix cinerea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba nachová (Salix purpurea)		bez černý (Sambucus nigra)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba nachová (Salix purpurea)			
		vrba jíva (Salix caprea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Hrozová (Trója)		km 9,785 - 22,330	3. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris				
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>				
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-60	
vrba křehká (Salix fragilis)	0-30	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20	
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	javor mléč (Acer platanoides)	10-20	
<i>stromy doplňkové</i>				
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	dub letní (Quercus robur)	0-10	
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	jilm polní (Ulmus minor)	0-10	
		jilm horský (Ulmus glabra)	0-10	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>				
vrba košíkářská (Salix viminalis)		líška obecná (Corylus avellana)		
vrba nachová (Salix purpurea)		svída krvavá (Swida sanguinea)		
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba jíva (Salix caprea)		
vrba popelavá (Salix cinerea)		kalina obecná (Viburnum opulus)		
		bez černý (Sambucus nigra)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.