

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lomná		km 8,700 -15,350		4. vegetační stupeň	
<b>vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)		70-100		vrba křehká (Salix fragilis)	
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		0-10		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	
střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10		střemcha hroznovitá (Padus avium)	
olše šedá (Alnus incana)		0-10		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	
vrba hlošínová (Salix eleagnos)		0-10		olše šedá (Alnus incana)	
vrba lýkovcová (Salix daphnoides)		0-10		vrba hlošínová (Salix eleagnos)	
				vrba lýkovcová (Salix daphnoides)	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lomná		km 8,700 -15,350		4. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	olše šedá (Alnus incana)	20-40
olše šedá (Alnus incana)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20
vrba křehká (Salix fragilis)	10-20	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20	olše šedá (Alnus incana)	10-20
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	topol osika (Populus tremula)	0-10	vrba hlošinová (Salix eleagnos)	0-10
vrba hlošinová (Salix eleagnos)	0-10	vrba lýkovcová (Salix daphnoides)	0-10	vrba lýkovcová (Salix daphnoides)	0-10
vrba lýkovcová (Salix daphnoides)	0-10				
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)		vrba nachová (Salix purpurea)	
		vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba jíva (Salix caprea)	
		bez černý (Sambucus nigra)		zimolez černý (Lonicera nigra)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lomná		km 8,700 -15,350		4. vegetační stupeň	
<b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
olše šedá (Alnus incana)	10-20	javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-30		
		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	olše šedá (Alnus incana)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	vrba křehká (Salix fragilis)	0-10		
vrba lýkovcová (Salix daphnoides)	0-10	jilm horský (Ulmus glabra)	0-10		
vrba hlošinová (Salix eleagnos)	0-10	lípa velkolistá (Tilia platyphylla)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba jíva (Salix caprea)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		líška obecná (Corylus avellana)			
		trnka obecná (Prunus spinosa)			
		zimolez černý (Lonicera nigra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.