

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lubina		km 0,000 - 23,460		3. vegetační stupeň	
<b>olšové vrbiny = AIS = <i>Alni glutinosae-saliceta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> )	40-60	olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> )	50-70		
vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-50	vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-40		
vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-50	vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-40		
vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )	0-30	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )	0-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	0-10	jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	0-10		
		topol černý ( <i>Populus nigra</i> )	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská ( <i>Salix viminalis</i> )		vrba popelavá ( <i>Salix cinerea</i> )			
vrba popelavá ( <i>Salix cinerea</i> )		vrba košíkářská ( <i>Salix viminalis</i> )			
vrba trojmužná ( <i>Salix triandra</i> )		vrba trojmužná ( <i>Salix triandra</i> )			
vrba nachová ( <i>Salix purpurea</i> )					

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lubina		km 0,000 - 23,460		3. vegetační stupeň	
<b>vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	50-70	vrba křehká (Salix fragilis)	50-70		
vrba červenavá (Salix x rubens)	20-50	vrba červenavá (Salix x rubens)	20-50		
vrba bílá (Salix alba)	0-30	vrba bílá (Salix alba)	0-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-10	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba košíkářská (Salix viminalis)			
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba trojmužná (Salix triandra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lubina		km 0,000 - 23,460		3. vegetační stupeň	
<b>dubové jaseniny = QFr = Querci roboris-fraxineta</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	dub letní (Quercus robur)	50-70		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
vrba bílá (Salix alba)	0-20				
<i>stromy doplňkové</i>					
dub letní (Quercus robur)	0-20	topol černý (Populus nigra)	10-20		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
topol černý (Populus nigra)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		trnka obecná (Prunus spinosa)			
		vrba popelavá (Salix cinerea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lubina		km 0,000 - 23,460		3. vegetační stupeň	
<b>topolo-jilmové jaseniny = UFrp = Ulmi-fraxineta populi</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	0-50	dub letní (Quercus robur)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50	topol černý (Populus nigra)	30-50		
vrba bílá (Salix alba)	0-30	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	20-40				
<i>stromy doplňkové</i>					
topol černý (Populus nigra)	10-20	jilm polní (Ulmus minor)	0-20		
dub letní (Quercus robur)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-20		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	javor mléč (Acer platanooides)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10		
jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		bez černý (Sambucus nigra)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba nachová (Salix purpurea)		hloh obecný (Crataegus laevigata)			
		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		svída krvavá (Swida sanguinea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lubina		km 0,000 - 23,460		3. vegetační stupeň	
<b>habro-jilmové jaseniny = UFrc = Ulmi-fraxineta carpini</b>					
břehové porosty		zastoupení v %	doprovodné porosty		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	dub letní (Quercus robur)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	jilm polní (Ulmus minor)	10-30		
vrba bílá (Salix alba)	0-20	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
		habr obecný (Carpinus betulus)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	topol černý (Populus nigra)	0-10		
jilm polní (Ulmus minor)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-20		
topol černý (Populus nigra)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		třešeň ptačí (Cerasus avium)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		líška obecná (Corylus avellana)			
		řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus)			
		trnka obecná (Prunus spinosa)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lubina		km 0,000 - 23,460		3. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAI = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
		vrba křehká (Salix fragilis)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-30	topol černý (Populus nigra)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
vrba lýkocová (Salix daphnoides)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
vrba hlošínovitá (Salix eleagnos)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		vrba lýkocová (Salix daphnoides)	0-10		
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10		
		jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba popelavá (Salix cinerea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba nachová (Salix purpurea)		krušina olšová (Frangula alnus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		bez černý (Sambucus nigra)			
		vrba jíva (Salix caprea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lubina		km 0,000 - 23,460		3. vegetační stupeň	
<b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	40-60		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
		javor mléč (Acer platanooides)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-20		
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	dub letní (Quercus robur)	0-10		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
vrba lýkocová (Salix daphnoides)	0-10	jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
vrba hlošinová (Salix eleagnos)	0-10	habr obecný (Carpinus betulus)	0-10		
		javor babyka (Acer campestre)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		líška obecná (Corylus avellana)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba jíva (Salix caprea)			
		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		krušina olšová (Frangula alnus)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.