

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Lučina		km 36,500 - 37,665		4. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	vrba křehká (Salix fragilis)	20-40
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20
olše šedá (Alnus incana)	10-20	olše šedá (Alnus incana)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	smrk ztepilý (Picea abies)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		topol osika (Populus tremula)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
		vrba nachová (Salix purpurea)			
		vrba jíva (Salix caprea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.