

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Moravice		km 13,150 - 87,500		4. vegetační stupeň	
vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
		zastoupení v %			
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	50-100	vrba křehká (Salix fragilis)	50-100		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-20	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-20		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20		
		jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba trojmužná (Salix triandra)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba košíkářská (Salix viminalis)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Moravice		km 13,150 - 87,500		4. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-50		
		vrba křehká (Salix fragilis)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		topol osika (Populus tremula)	0-10		
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10		
		smrk ztepilý (Picea abies)	0-20		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		krušina olšová (Frangula alnus)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		bez černý (Sambucus nigra)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
		vrba popelavá (Salix cinerea)			
		vrba nachová (Salix purpurea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Moravice		km 13,150 - 87,500		4. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris					
břehové porosty		zastoupení v %		doprovodné porosty	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	20-40		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-30		
		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	javor mléč (Acer platanooides)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20	vrba křehká (Salix fragilis)	0-10		
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	smrk ztepilý (Picea excelsa)	0-10		
		topol osika (Populus tremula)	0-10		
		javor mléč (Acer platanooides)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
		buk lesní (Fagus sylvatica)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		krušina olšová (Frangula alnus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba jíva (Salix caprea)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
		líška obecná (Corylus avellana)			
		hloh obecný (Crataegus laevigata)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.