

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

| Vodní tok: Moravice | | km 87,500 - 91,245 | | 5. vegetační stupeň | |
|---|--------|------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis | | | | | |
| <i>břehové porosty</i> | | zastoupení v % | | <i>doprovodné porosty</i> | |
| | | | | zastoupení v % | |
| <i>stromy základní</i> | | | | | |
| vrba křehká (Salix fragilis) | 50-100 | vrba křehká (Salix fragilis) | 40-80 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 0-30 |
| | | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 0-30 | | |
| <i>stromy doplňkové</i> | | | | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 0-30 | střemcha hroznovitá (Padus avium) | 0-20 | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 0-30 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 0-20 | | |
| střemcha hroznovitá (Padus avium) | 0-10 | | | | |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i> | | | | | |
| vrba nachová (Salix purpurea) | | vrba nachová (Salix purpurea) | | | |

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

| Vodní tok: Moravice | | km 87,500 - 91,245 | | 5. vegetační stupeň | |
|---|-------|------------------------------------|-------|---------------------------|--|
| <i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i> | | | | | |
| <i>břehové porosty</i> | | zastoupení v % | | <i>doprovodné porosty</i> | |
| <i>stromy základní</i> | | | | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 30-50 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 40-80 | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 0-30 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | 0-30 | | |
| vrba křehká (Salix fragilis) | 40-60 | vrba křehká (Salix fragilis) | 10-30 | | |
| | | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 20-40 | | |
| <i>stromy doplňkové</i> | | | | | |
| jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | 0-20 | střemcha hroznovitá (Padus avium) | 0-20 | | |
| střemcha hroznovitá (Padus avium) | 0-20 | javor klen (Acer pseudoplatanus) | 0-10 | | |
| | | smrk ztepilý (Picea abies) | 0-20 | | |
| | | topol osika (Populus tremula) | 0-10 | | |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i> | | | | | |
| vrba nachová (Salix purpurea) | | vrba nachová (Salix purpurea) | | | |
| | | vrba popelavá (Salix cinerea) | | | |
| | | kalina obecná (Viburnum opulus) | | | |
| | | krušina olšová (Frangula alnus) | | | |
| | | bez hroznatý (Sambucus racemosa) | | | |
| | | vrba jíva (Salix caprea) | | | |

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

| Vodní tok: Moravice | | km 87,500 - 91,245 | | 5. vegetační stupeň | |
|--|--|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris | | | | | |
| <i>břehové porosty</i> | | zastoupení v % | <i>doprovodné porosty</i> | | zastoupení v % |
| <i>stromy základní</i> | | | | | |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | | 30-50 | olše lepkavá (Alnus glutinosa) | | 20-40 |
| olše lepkavá (Alnus glutinosa) | | 0-30 | javor klen (Acer pseudoplatanus) | | 10-30 |
| vrba křehká (Salix fragilis) | | 30-50 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | | 10-30 |
| | | | lípa srdčitá (Tilia cordata) | | 0-20 |
| <i>stromy doplňkové</i> | | | | | |
| javor klen (Acer pseudoplatanus) | | 0-10 | olše šedá (Alnus incana) | | 0-20 |
| jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) | | 0-10 | jilm horský (Ulmus glabra) | | 0-10 |
| střemcha hroznovitá (Padus avium) | | 0-10 | vrba křehká (Salix fragilis) | | 0-10 |
| | | | topol osika (Populus tremula) | | 0-10 |
| | | | střemcha hroznovitá (Padus avium) | | 0-10 |
| | | | smrk ztepilý (Picea excelsa) | | 0-10 |
| | | | buk lesní (Fagus sylvatica) | | 0-10 |
| | | | jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) | | 0-10 |
| <i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i> | | | | | |
| vrba nachová (Salix purpurea) | | | kalina obecná (Viburnum opulus) | | |
| | | | krušina olšová (Frangula alnus) | | |
| | | | vrba jíva (Salix caprea) | | |
| | | | bez hroznatý (Sambucus racemosa) | | |
| | | | zimolez černý (Lonicera nigra) | | |
| | | | líška obecná (Corylus avellana) | | |

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.