

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 0,000 - 19,900		4. vegetační stupeň	
<b>olšové vrbiny = AIS = <i>Alni glutinosae-saliceta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> )	60-80	olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> )	60-80	vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-40
vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-40	vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-40	vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-40
vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-40	vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-40		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	0-10	jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	0-10	střemcha hroznovitá ( <i>Padus avium</i> )	0-10
střemcha hroznovitá ( <i>Padus avium</i> )	0-10	střemcha hroznovitá ( <i>Padus avium</i> )	0-10		
<i>příпустné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová ( <i>Salix purpurea</i> )		vrba trojmužná ( <i>Salix triandra</i> )		vrba košíkářská ( <i>Salix viminalis</i> )	
vrba trojmužná ( <i>Salix triandra</i> )		vrba košíkářská ( <i>Salix viminalis</i> )		vrba popelavá ( <i>Salix cinerea</i> )	
vrba košíkářská ( <i>Salix viminalis</i> )		vrba popelavá ( <i>Salix cinerea</i> )			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 0,000 - 19,900		4. vegetační stupeň	
<b>vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)		50-100		vrba křehká (Salix fragilis)	
vrba červenavá (Salix x rubens)		0-50		vrba červenavá (Salix x rubens)	
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		0-10		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	
střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10		jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)				vrba košíkářská (Salix viminalis)	
vrba nachová (Salix purpurea)				vrba nachová (Salix purpurea)	
vrba trojmužná (Salix triandra)				vrba trojmužná (Salix triandra)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 0,000 - 19,900		4. vegetační stupeň	
<b>dubové jaseniny = QFr = Querci roboris-fraxineta</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	dub letní (Quercus robur)	30-50		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
dub letní (Quercus robur)	0-10	topol černý (Populus nigra)	0-10		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
topol černý (Populus nigra)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
		javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
		javor babyka (Acer campestre)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba popelavá (Salix cinerea)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		krušina olšová (Frangula alnus)			
		trnka obecná (Prunus spinosa)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 0,000 - 19,900		4. vegetační stupeň	
<b>habro-jilmové jaseniny = UFrc = Ulmi-fraxineta carpini</b>					
břehové porosty		zastoupení v %	doprovodné porosty		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	dub letní (Quercus robur)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	jilm polní (Ulmus minor)	10-20		
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
		habr obecný (Carpinus betulus)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	topol černý (Populus nigra)	0-10		
jilm polní (Ulmus minor)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
topol černý (Populus nigra)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
		třešeň ptačí (Cerasus avium)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba nachová (Salix purpurea)		trnka obecná (Prunus spinosa)			
		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		líška obecná (Corylus avellana)			
		řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus)			
		bez černý (Sambucus nigra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 0,000 - 19,900		4. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAI = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20		
		vrba červenavá (Salix x rubens)	0-10		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	topol černý (Populus nigra)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
		javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba popelavá (Salix cinerea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba nachová (Salix purpurea)		krušina olšová (Frangula alnus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		bez černý (Sambucus nigra)			
		vrba jíva (Salix caprea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 0,000 - 19,900		4. vegetační stupeň	
<b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	40-60		
vrba křehká (Salix fragilis)	20-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	lípa velkolistá (Tilia platyphylla)	0-20		
		javor mléč (Acer platanoides)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
sřemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-10		
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	dub letní (Quercus robur)	0-10		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	sřemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
		habr obecný (Carpinus betulus)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		líška obecná (Corylus avellana)			
vrba nachová (Salix purpurea)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba jíva (Salix caprea)			
		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		bez černý (Sambucus nigra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.