

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 19,900 - 26,675		4. vegetační stupeň	
<i>vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
		zastoupení v %			
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	50-100	vrba křehká (Salix fragilis)	40-80	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-30
		olše šedá (Alnus incana)	0-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-30	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20
olše šedá (Alnus incana)	0-30				
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10				
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba trojmužná (Salix triandra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 19,900 - 26,675		4. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-10	vrba křehká (Salix fragilis)	10-30		
		vrba červenavá (Salix x rubens)	0-10		
<i>olše lepkavá (Alnus glutinosa)</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	olše šedá (Alnus incana)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	smrk ztepilý (Picea abies)	0-10		
olše šedá (Alnus incana)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		bez černý (Sambucus nigra)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba nachová (Salix purpurea)			
		vrba popelavá (Salix cinerea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opavice		km 19,900 - 26,675		4. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	20-40		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-30		
		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	olše šedá (Alnus incana)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-20	smrk ztepilý (Picea abies)	0-10		
olše šedá (Alnus incana)	0-20	jilm horský (Ulmus glabra)	0-10		
		lípa velkolistá (Tilia platyphylla)	0-10		
		javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
		třešeň ptačí (Cerasus avium)	0-10		
		střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		krušina olšová (Frangula alnus)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba jíva (Salix caprea)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
		líška obecná (Corylus avellana)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.