

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Kočovský potok		km 13,400 -16,560		5. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		40-70	olše lepkavá (Alnus glutinosa)		40-60
vrba křehká (Salix fragilis)		20-40	vrba křehká (Salix fragilis)		10-20
			jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		10-30
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)		0-10
			smrk ztepilý (Picea abies)		0-10
			bříza bělokorá (Betula pendula)		0-10
			topol osika (Populus tremula)		0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)			vrba nachová (Salix purpurea)		
vrba popelavá (Salix cinerea)			vrba popelavá (Salix cinerea)		
			vrba jíva (Salix caprea)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.