

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Oldřišovský potok km 4,650 - 9,725		3. (2.) vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>			
<i>břehové porosty</i>	zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>			
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-60
vrba bílá (Salix alba)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40
		vrba bílá (Salix alba)	10-20
		topol černý (Populus nigra)	10-20
<i>stromy doplňkové</i>			
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba nachová (Salix purpurea)	
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)	
		bez černý (Sambucus nigra)	
		vrba jíva (Salix caprea)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Oldřišovský potok km 4,650 - 9,725		3. (2.) vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris			
<i>břehové porosty</i>	zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
stromy základní			
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-60
vrba bílá (Salix alba)	10-30	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20
		lípa velkolistá (Tilia platyphylla)	10-20
		javor mléč (Acer platanoides)	10-20
stromy doplňkové			
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	dub letní (Quercus robur)	0-10
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	jilm polní (Ulmus minor)	0-10
		javor babyka (Acer campestre)	0-10
přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		líška obecná (Corylus avellana)	
vrba nachová (Salix purpurea)		svída krvavá (Swida sanguinea)	
		vrba jíva (Salix caprea)	
		kalina obecná (Viburnum opulus)	
		bez černý (Sambucus nigra)	
		hloh obecný (Crataegus laevigata)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Oldřišovský potok km 12,000 - 26,260		3. vegetační stupeň	
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>			
<i>břehové porosty</i>	zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>			
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-60
vrba červenavá (Salix x rubens)	10-20	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40
vrba křehká (Salix fragilis)	20-50	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20
		vrba červenavá (Salix x rubens)	0-10
		topol černý (Populus nigra)	10-20
<i>stromy doplňkové</i>			
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10
vrba bílá (Salix alba)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10
		vrba bílá (Salix alba)	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba nachová (Salix purpurea)	
vrba nachová (Salix purpurea)		kalina obecná (Viburnum opulus)	
		bez černý (Sambucus nigra)	
		vrba jíva (Salix caprea)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Oldřišovský potok		km 12,000 - 26,260	3. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris				
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
stromy základní				
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-60	
vrba červenavá (Salix x rubens)	10-20	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20	
vrba křehká (Salix fragilis)	10-20	lípa velkolistá (Tilia platyphylla)	10-20	
		javor mléč (Acer platanoides)	10-20	
stromy doplňkové				
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	dub letní (Quercus robur)	0-10	
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	jilm polní (Ulmus minor)	0-10	
		javor babyka (Acer campestre)	0-10	
přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)				
vrba košíkářská (Salix viminalis)		líška obecná (Corylus avellana)		
vrba nachová (Salix purpurea)		svída krvavá (Swida sanguinea)		
		vrba jíva (Salix caprea)		
		kalina obecná (Viburnum opulus)		
		bez černý (Sambucus nigra)		
		hloh obecný (Crataegus laevigata)		
		trnka (Prunus spinosa)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.