

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opava		km 0,000 - 82,500		3. vegetační stupeň	
olšové vrbiny = AIS = <i>Alni glutinosae-saliceta</i>					
břehové porosty		zastoupení v %	doprovodné porosty		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)		60-80	olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)		60-80
vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)		0-40	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)		0-40
vrba červenavá (<i>Salix x rubens</i>)		0-40	vrba červenavá (<i>Salix x rubens</i>)		0-40
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)		0-10	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)		0-20
střemcha hroznovitá (<i>Padus avium</i>)		0-10	topol černý (<i>Populus nigra</i>)		0-10
			střemcha hroznovitá (<i>Padus avium</i>)		0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (<i>Salix viminalis</i>)			vrba popelavá (<i>Salix cinerea</i>)		
vrba popelavá (<i>Salix cinerea</i>)			vrba košíkářská (<i>Salix viminalis</i>)		
vrba trojmužná (<i>Salix triandra</i>)			krušina olšová (<i>Frangula alnus</i>)		
vrba nachová (<i>Salix purpurea</i>)					

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opava		km 0,000 - 82,500		3. vegetační stupeň	
vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	50-100	vrba křehká (Salix fragilis)	50-100		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50	vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50		
vrba bílá (Salix alba)	0-30	vrba bílá (Salix alba)	0-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-10	olše lepkavá (Alnus glutinosa)			
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)			
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba košíkářská (Salix viminalis)			
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba trojmužná (Salix triandra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opava		km 0,000 - 82,500		3. vegetační stupeň	
dubové jaseniny = QFr = Querci roboris-fraxineta					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-60	dub letní (Quercus robur)	50-70		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
vrba bílá (Salix alba)	0-20				
<i>stromy doplňkové</i>					
dub letní (Quercus robur)	10-20	topol černý (Populus nigra)	0-10		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
topol černý (Populus nigra)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10		
		jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
		javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba popelavá (Salix cinerea)			
		svída krvavá (Swida sanguinea)			
		bez černý (Sambucus nigra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opava		km 0,000 - 82,500		3. vegetační stupeň	
topolo-jilmové jaseniny = UFrp = Ulmi-fraxineta populi					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-70	dub letní (Quercus robur)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-50	topol černý (Populus nigra)	50-70		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba bílá (Salix alba)	0-20				
<i>stromy doplňkové</i>					
topol černý (Populus nigra)	10-20	jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
dub letní (Quercus robur)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	vrba křehká (Salix fragilis)	0-10		
jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	vrba červenavá (Salix x rubens)	0-10		
		topol osika (Populus tremula)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		bez černý (Sambucus nigra)			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		krušina olšová (Frangula alnus)			
		trnka obecná (Prunus spinosa)			
		hloh obecný (Crataegus laevigata)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opava		km 0,000 - 82,500		3. vegetační stupeň	
habro-jilmové jaseniny = UFrc = Ulmi-fraxineta carpini					
břehové porosty		zastoupení v %		doprovodné porosty	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-7%	dub letní (Quercus robur)	20-40		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	jilm polní (Ulmus minor)	10-20		
vrba bílá (Salix alba)	0-30	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
		habr obecný (Carpinus betulus)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	topol černý (Populus nigra)	0-10		
jilm polní (Ulmus minor)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
topol černý (Populus nigra)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
		třešeň ptačí (Cerasus avium)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba nachová (Salix purpurea)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		líška obecná (Corylus avellana)			
		řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus)			
		hloh obecný (Crataegus laevigata)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)			
Vodní tok: Opava		km 0,000 - 82,500	3. vegetační stupeň
<i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i>			
<i>břehové porosty</i>	zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %
<i>stromy základní</i>			
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	vrba křehká (Salix fragilis)	10-20
		vrba červenavá (Salix x rubens)	0-20
<i>stromy doplňkové</i>			
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	topol černý (Populus nigra)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20
		javor mléč (Acer platanoides)	0-10
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10
		lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>			
vrba košíkářská (Salix viminalis)		kalina obecná (Viburnum opulus)	
vrba trojmužná (Salix triandra)		krušina olšová (Frangula alnus)	
vrba nachová (Salix purpurea)		bez černý (Sambucus nigra)	
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba popelavá (Salix cinerea)	
		vrba jíva (Salix caprea)	

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v šech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Opava		km 0,000 - 82,500		3. vegetační stupeň	
javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	40-60		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	lípa velkolistá (Tilia platyphylla)	0-20		
		javor mléč (Acer platanoides)	10-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-10		
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	dub letní (Quercus robur)	0-10		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-20		
		jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
		vrba křehká (Salix fragilis)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		líška obecná (Corylus avellana)			
vrba nachová (Salix purpurea)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba jíva (Salix caprea)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		hloh obecný (Crataegus laevigata)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.