

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Řecice		km 0,000 -		4. vegetační stupeň	
<b>vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</b>					
břehové porosty		zastoupení v %		doprovodné porosty	
		zastoupení v %			
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)		30-70		vrba křehká (Salix fragilis)	
vrba červenavá (Salix x rubens)		0-30		vrba červenavá (Salix x rubens)	
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		0-20		olše lepkavá (Alnus glutinosa)	
olše šedá (Alnus incana)		0-20		olše šedá (Alnus incana)	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Řečice		km 0,000 -		4. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50		
olše šedá (Alnus incana)	10-30	olše šedá (Alnus incana)	10-30		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	vrba křehká (Salix fragilis)	10-30		
		vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	smrk ztepilý (Picea excelsa)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		topol osika (Populus tremula)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba nachová (Salix purpurea)			
		vrba popelavá (Salix cinerea)			
		vrba jíva (Salix caprea)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Řečice		km 0,000 -		4. vegetační stupeň	
<b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	30-50	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40		
olše šedá (Alnus incana)	10-30	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-20		
vrba křehká (Salix fragilis)	30-50	javor klen (Acer pseudoplatanus)	10-30		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-20	olše šedá (Alnus incana)	0-10		
		smrk ztepilý (Picea excelsa)	0-20		
		topol osika (Populus tremula)	0-10		
		buk lesní (Fagus sylvatica)	0-10		
		javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba jíva (Salix caprea)			
		vrba ušatá (Salix aurita)			
		líška obecná (Corylus avellana)			
		bez hroznatý (Sambucus racemosa)			
		zimolez černý (Lonicera nigra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.