

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Sednice		km 0,000 - 18,300		3. vegetační stupeň	
<b>olšové vrbiny = AIS = <i>Alni glutinosae-saliceta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> )	60-80	olše lepkavá ( <i>Alnus glutinosa</i> )	60-80	vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-40
vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-40	vrba křehká ( <i>Salix fragilis</i> )	0-40	vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-40
vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-40	vrba červenavá ( <i>Salix x rubens</i> )	0-40	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )	0-20
vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )	0-20	vrba bílá ( <i>Salix alba</i> )	0-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	0-10	jasan ztepilý ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	0-10	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )	0-10
topol černý ( <i>Populus nigra</i> )	0-10	topol černý ( <i>Populus nigra</i> )	0-10	střemcha hroznovitá ( <i>Padus avium</i> )	0-10
střemcha hroznovitá ( <i>Padus avium</i> )	0-10	střemcha hroznovitá ( <i>Padus avium</i> )	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská ( <i>Salix viminalis</i> )		vrba popelavá ( <i>Salix cinerea</i> )		krušina olšová ( <i>Frangula alnus</i> )	
vrba popelavá ( <i>Salix cinerea</i> )					
vrba trojmužná ( <i>Salix triandra</i> )					

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Sedlnice		km 0,000 - 18,300		3. vegetační stupeň	
<b>vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
<i>stromy základní</i>					
vrba křehká (Salix fragilis)	50-100	vrba křehká (Salix fragilis)	50-100	vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50	vrba bílá (Salix alba)	0-30	vrba bílá (Salix alba)	0-30
vrba bílá (Salix alba)	0-30				
<i>stromy doplňkové</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-20	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	10-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10				
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba košíkářská (Salix viminalis)		vrba nachová (Salix purpurea)	
vrba nachová (Salix purpurea)		vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba trojmužná (Salix triandra)	
vrba trojmužná (Salix triandra)					

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Sedlnice		km 0,000 - 18,300		3. vegetační stupeň	
<b>dubové jaseniny = QFr = Querci roboris-fraxineta</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
				zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	dub letní (Quercus robur)	30-80		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-60		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
vrba bílá (Salix alba)	0-20				
<i>stromy doplňkové</i>					
dub letní (Quercus robur)	0-20	topol černý (Populus nigra)	10-20		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
topol černý (Populus nigra)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
		javor babyka (Acer campestre)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		kalina obecná (Viburnum opulus)			
vrba popelavá (Salix cinerea)		vrba popelavá (Salix cinerea)			
		svída krvavá (Swida sanguinea)			
		trnák obecná (Prunus spinosa)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		hloh obecný (Crataegus laevigata)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Sedlnice		km 0,000 - 18,300	3. vegetační stupeň	
<b>topolo-jilmové jaseniny = UFrp = Ulmi-fraxineta populi</b>				
<i>břehové porosty</i>	zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>	zastoupení v %	
<i>stromy základní</i>				
vrba křehká (Salix fragilis)	0-50	dub letní (Quercus robur)	30-50	
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-50	topol černý (Populus nigra)	30-50	
vrba bílá (Salix alba)	0-20	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	20-40	
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	20-40			
<i>stromy doplňkové</i>				
topol černý (Populus nigra)	10-20	jilm polní (Ulmus minor)	0-10	
dub letní (Quercus robur)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10	
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanooides)	0-10	
jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	
		vrba křehká (Salix fragilis)	0-10	
		vrba červenavá (Salix x rubens)	0-10	
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>				
vrba košíkářská (Salix viminalis)		bez černý (Sambucus nigra)		
vrba trojmužná (Salix triandra)		brslen evropský (Euonymus europaea)		
vrba nachová (Salix purpurea)		hloh obecný (Crataegus laevigata)		
		kalina obecná (Viburnum opulus)		
		svída krvavá (Swida sanguinea)		
		trnka obecná (Prunus spinosa)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Sedlnice		km 0,000 - 18,300		3. vegetační stupeň	
<b>habro-jilmové jaseniny = UFrc = Ulmi-fraxineta carpini</b>					
břehové porosty		zastoupení v %		doprovodné porosty	
		zastoupení v %			
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	dub letní (Quercus robur)	30-50		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	30-50		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-40	jilm polní (Ulmus minor)	10-30		
vrba bílá (Salix alba)	0-20	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-20		
		habr obecný (Carpinus betulus)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	topol černý (Populus nigra)	0-10		
jilm polní (Ulmus minor)	0-10	jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
topol černý (Populus nigra)	0-10	javor babyka (Acer campestre)	0-10		
střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10	javor mléč (Acer platanoides)	0-10		
jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)	0-10		
		třešeň ptačí (Cerasus avium)	0-10		
		javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		brslen evropský (Euonymus europaea)			
vrba nachová (Salix purpurea)		trnka obecná (Prunus spinosa)			
		bez černý (Sambucus nigra)			
		líška obecná (Corylus avellana)			
		řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus)			
		hloh obecný (Crataegus laevigata)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů v všech

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Sedlnice		km 0,000 - 18,300		3. vegetační stupeň	
<b><i>jasanové olšiny = FrAl = Fraxini-alneta</i></b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %	<i>doprovodné porosty</i>		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)		40-70	olše lepkavá (Alnus glutinosa)		30-50
vrba křehká (Salix fragilis)		0-40	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		30-50
vrba červenavá (Salix x rubens)		0-40	vrba křehká (Salix fragilis)		10-20
			vrba červenavá (Salix x rubens)		0-20
<i>stromy doplňkové</i>					
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		10-20	topol černý (Populus nigra)		0-10
střemcha hroznovitá (Padus avium)		0-10	střemcha hroznovitá (Padus avium)		10-20
			lípa srdčitá (Tilia cordata)		0-10
			javor mléč (Acer platanooides)		0-10
			javor klen (Acer pseudoplatanus)		0-10
			jilm polní (Ulmus minor)		0-10
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)			vrba popelavá (Salix cinerea)		
vrba trojmužná (Salix triandra)			kalina obecná (Viburnum opulus)		
vrba nachová (Salix purpurea)			krušina olšová (Frangula alnus)		
vrba popelavá (Salix cinerea)			bez černý (Sambucus nigra)		
			vrba nachová (Salix purpurea)		

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Sedlnice		km 0,000 - 18,300		3. vegetační stupeň	
<b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b>					
břehové porosty		zastoupení v %	doprovodné porosty		zastoupení v %
<i>stromy základní</i>					
olše lepkavá (Alnus glutinosa)	40-70	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	40-60		
vrba křehká (Salix fragilis)	0-40	lípa srdčitá (Tilia cordata)	10-30		
vrba červenavá (Salix x rubens)	0-30	javor mléč (Acer platanooides)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20	olše lepkavá (Alnus glutinosa)	0-10		
lípa srdčitá (Tilia cordata)	0-10	dub letní (Quercus robur)	0-10		
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	10-20	střemcha hroznovitá (Padus avium)	10-20		
javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10	javor klen (Acer pseudoplatanus)	0-10		
		jilm polní (Ulmus minor)	0-10		
		habr obecný (Carpinus betulus)	0-10		
		javor babyka (Acer campestre)	0-10		
		jilm vaz (Ulmus laevis)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
vrba košíkářská (Salix viminalis)		líška obecná (Corylus avellana)			
vrba nachová (Salix purpurea)		svída krvavá (Swida sanguinea)			
vrba trojmužná (Salix triandra)		vrba jíva (Salix caprea)			
		hloh obecný (Crataegus laevigata)			
		kalina obecná (Viburnum opulus)			
		krušina olšová (Frangula alnus)			
		bez černý (Sambucus nigra)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin v úseku.