

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků  
(podle skupin typů geobiocénů)

Vodní tok: Zlatý potok		km 0,000 - 2,834		3. vegetační stupeň	
<b>javoro-jasanové olšiny = FrAlac = Fraxini-alneta aceris</b>					
<i>břehové porosty</i>		zastoupení v %		<i>doprovodné porosty</i>	
		zastoupení v %			
<i>stromy základní</i>					
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	30-50	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	30-60		
Salix fragilis (vrba křehká)	20-40	Tilia cordata (lípa srdčitá)	10-20		
		Acer platanoides (javor mléč)	10-20		
<i>stromy doplňkové</i>					
Tilia cordata (lípa srdčitá)	0-10	Alnus glutinosa (olše lepkavá)	0-10		
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	0-20	Acer pseudoplatanus (javor klen)	0-10		
Salix x rubens (vrba červenavá)	0-10	Ulmus glabra (jilm horský)	0-10		
<i>přípustné druhy keřů (poměrné zastoupení se nesleduje)</i>					
Salix viminalis (vrba košíkářská)		Corylus avellana (líška obecná)			
Salix purpurea (vrba nachová)		Salix caprea (vrba jíva)			
		Viburnum opulus (kalina obecná)			
		Sambucus nigra (bez černý)			

Poznámka: Při výsadbě se poměrné zastoupení dřevin v % na vymezeném úseku stanoví z počtu kusů jednoho druhu a počtu kusů všech dřevin.